

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -9-7-73 548533

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 206 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57 XXXXXXXXXXXX (80)22.19.38

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

30 Frs

Supplément n° 1 Bulletin 154 - Juillet 1973

6 Juillet 1973

## V I G N E

Les importants orages survenus le 5 Juillet (au soir) en BEAUJOLAIS, SAONE-ET-LOIRE et COTE D'OR notamment, accompagnés de grêle localement ont provoqué le "lessivage des produits appliqués fin juin selon les modalités de la dernière note.

Rappelons qu'il est recommandé lors d'une chute de grêle d'effectuer le plus rapidement possible, dans un délai de 24 heures maximum, un traitement à base de captane ou de fénitrop (Phaltane) en vue de la cicatrisation des plaies.

MILDIOU : La protection doit être assurée à nouveau en BEAUJOLAIS, SAONE-ET-LOIRE et COTE-D'OR avant le 12 Juillet.

Dans le JURA, où localement des orages se sont abattus, dans l'YONNE et la NIEVRE, effectuer également un traitement avant le 12 Juillet (en vue de la protection des grappes).

N.B. : L'attention est attirée sur la nécessité de bien toucher les grappes (cf. dernière note)

BOTRYTIS : Rappel. Les conditions sont favorables actuellement à l'installation de la maladie.

OIDIUM : Ajouter un soufre micronisé mouillable. La dose sera fixée en fonction de la température au moment du traitement.

COCHYLIS-EUDEMIS : Ajouter un insecticide de type préventif en BEAUJOLAIS et MACONNAIS où le vol a débuté depuis quelques jours. Le traitement doit être envisagé, notamment dans tous les vignobles de ces régions, où des dégâts ont été constatés.

## ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES : Un traitement est conseillé à la réception du bulletin pour les vergers dont la protection date d'une dizaine de jours. Les températures élevées ont raccourci la durée d'incubation des oeufs mais sont également responsables d'un pourcentage assez élevé d'oeufs avortés.

Renouveler également la protection dans les zones où les précipitations orageuses ont été importantes.

OIDIUM DU POMMIER : Ajouter un anti-oidium à la bouillie ci-dessus.

Dernière note : Bulletin n° 154 Juillet 1973

Les Ingénieurs chargés  
des Avertissements Agricoles :

J. PETIOT - M. TISSOT

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P 415